

MAXI MILK GOLD CALF 50%

Υποκατάστατο μητρικού γάλακτος σε σκόνη για νεαρούς μόσχους

Περιέχει 50% σκόνη αποβουτυρωμένου γάλακτος

Συστατικά : Αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη 50%, ορός γάλακτος σε σκόνη, φυτικά έλαια, θειικό μαγνήσιο, ανθρακικό ασβέστιο, διπτανθρακικό νάτριο,.

Αναλυτικά Συστατικά	%	Πρόσθετες ύλες	Ανά κιλό
Ολικές Αζωτούχες Ουσίες	21,50 %	Βιταμίνες, προβιταμίνες, χημικώς προσδιορισμένες ουσίες	
Ολικές Λιπαρές Ουσίες	18,00 %	παρόμοιοι αποτελέσματος	
Ολικές Ινώδεις Ουσίες	0,00 %	(3a672a) Βιταμίνη Α	25.000 I.U
Ολική Τέφρα	7,30 %	(3a671) Βιταμίνη D3	10.000 I.U
Ολικός Φωσφόρος	0,7 %	(3a700) Βιταμίνη Ε (dl-a-tocoph.-acet)	100 mg/kg
Ασβέστιο	0,8 %		
Νάτριο	0,5 %		
Ιχνοστοιχεία (mg/kg)			
Σίδηρος	Θειικός σίδηρος, μονοένυδρος – 3b103 Χηλικό σύμπλοκο σιδήρου-γλυκίνης, ένυδρο - 3b108		51
Χαλκός	(Θειικός χαλκός, πενταένυδρος – 3b405) (Χηλικό σύμπλοκο χαλκού-γλυκίνης, ένυδρο – 3b413)		15
Ψευδάργυρος	Θειικός ψευδάργυρος, μονοένυδρος – 3b605 Χηλικό σύμπλοκο ψευδαργύρου-γλυκίνης, ένυδρο – 3b607		95
Μαγγάνιο	Θειικό μαγγάνιο, μονοένυδρο – 3b503 Χηλικό σύμπλοκο μαγγανίου-γλυκίνης, ένυδρο – 3b506		30
Ιώδιο	Ιωδίδιο του καλίου – 3b201		4
Σελήνιο	Οργανικό σελήνιο – 3b8.11		0.3

Αντιοξειδωτικά : BHT (E321): 17 mg/kg

Οδηγίες Χρήσεως:

Υπολογίστε αραιώση 1 kg σκόνη γάλακτος σε 7 λίτρο νερού.

1) Ρίξτε προσεκτικά την προσεκτικά μετρημένη ποσότητα σκόνης γάλακτος σε νερό θερμοκρασίας 45 °C.

2) Αναδεύσατε ζωηρά ώστε να αποκτήσετε ένα ομογενές μίγμα.

3) Το παρασκεύασμα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 °C.

Να χρησιμοποιείτε πόσιμο νερό και καθαρά εργαλεία κατά την παρασκευή. Ο σάκος να κλείνεται μετά τη χρήση και να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση και με αυτόματες μηχανές τσίματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ:

- Να παρέχετε στα ζώα καθαρό πόσιμο νερό
- Να εφοδιάζετε τα ζώα με σανό ή χόρτο καλής ποιότητας
- Χορηγήστε εναρκτήρια τροφή από τη 2^η εβδομάδα ζωής και να ανανεώνετε καθημερινά

2 ΓΕΥΜΑΤΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ				ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΑΪΣΜΑΤΟΣ				
ΕΒΔΟΜΑΔΑ (μετά το πρωτόγαλα)	ΝΕΡΟ (L ανά γεύμα)	ΣΚΟΝΗ ΓΑΛΛΑ (g /γεύμα)	ΣΥΝΟΛΟ (L ανά γεύμα)	ΠΕΡΙΟΔΟΣ (μετά το πρωτόγαλα)	ΔΙΑΡΚΕΙΑ (Ημέρες)	ΓΕΥΜΑ (L ανά ημέρα)	ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ (g /L νερού)	
1	2,7	390	3	ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΚΟΥΒΑ	1 ^η – 4 ^η ημέρα	-	2 x 2 L	145
2	3,6	520	4		5 ^η – 6 ^η ημέρα	-	2 x 2,5 L	145
3	3,6	520	4	ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΑΪΣΜΑΤΟΣ	Περίοδος 1	7 ημέρες	5 ως 6 L	145
4	3,6	520	4		Περίοδος 2	7 ημέρες	6 ως 7 L	145
5	3,6	520	4		Περίοδος 3	14 ημέρες	7 L	145
6	3,6	520	4		Περίοδος 4	35 ημέρες	7 ως 2,5 L	145
7	2,7	390	3		Περίοδος 5	3 ημέρες	2,5 ως 0 L	145
8	1,8	260	2					
9	1,8	260	2					

Παράγεται στη Γαλλία (FR 50 48 4002)



Κ. ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

N. Παπαγιαννοπούλου 143, 194 00 Κίτσι Κορωπίου

Τηλ: 210 3468304, info@copharm.gr

Αρ. Κωδ. Εγγραφής ΥΠΑΑΤ: 02220 023 000126 / Αρ. Κωδ. Εγκρίσης ΥΠΑΑΤ: αΕL023 0020